

سئوالات آسکی گروه گفتار درمانی

ناروانی در گفتار

۱. در این ایستگاه با پسر بچه ای ۴ ساله با علائم لکنت به همراه والدین خود به کلینیک مراجعه کرده است، روبرو می شوید. همکار شما ارزیابی کامل از او انجام داده و نتیجه را برای شما ارسال نموده است. شما تصمیم گرفته اید که از برنامه درمانی لید کامب برای درمان وی استفاده کنید. جلسه اول درمان لید کامب را (برای کودک و مادر) اجرا نمایید
۲. آراد کودکی ۴.۵ ساله است که از ۳ سالگی از لکنت زبان رنج می برد. از ۱۲ ماه گذشته برنامه درمانی لید کامب برای او شروع شده است و تاکنون ۴۲ جلسه درمانی داشته است. در حال حاضر ۵ هفته است که در مقیاس سنجش شدت لکنت ۰ تا ۹ شدت لکنت وی برابر ۱ باقی مانده است. چه مواردی را لازم است در کودک و والدین ارزیابی نمایید؟ پیشنهاد درمانی شما چیست؟
۳. در این ایستگاه با مراجعی 21 ساله که با علائم لکنت به کلینیک شما مراجعه کرده است، روبرو می شوید. همکار شما ارزیابی کامل از او انجام داده و نتیجه را برای شما ارسال نموده است. شما تصمیم گرفته اید که از برنامه درمانی Camperdown برای درمان وی استفاده کنید. جلسه اول درمان را برای مراجع اجرا نمایید.
۴. محمد کودکی ۸ ساله است که برای درمان لکنت مراجعه کرده است. لکنت وی از ۳ سالگی شروع شده و او یک دوره درمان ۶ ماهه ناموفق لید کامب در ۵ سالگی داشته است. محمد از حرف زدن اجتناب می کند. در مدرسه مورد تمسخر قرار می گیرد و نگرش ارتباطی مناسبی ندارد. او به همراه مادرش به کلینیک شما مراجعه کرده است و تصمیم گرفته اید از روش درمان جامع لکنت Yaruss بهره بگیرید. در جلسه اولی ارزیابی جامع از شرایط محمد به عمل آورید.
۵. محدثه دختری نوجوان است که برای درمان لکنت به کلینیک شما مراجعه کرده است. وی علاقمند به درمان است ولی با توجه به اینکه دروس سنگینی دارد و در فاصله نسبتاً دوری از کلینیک شما زندگی می کند تصمیم گرفته اید از Telehealth استفاده کنید. برای محدثه توضیح دهید که Telehealth برای او مناسب است و تفاوت آن را با درمان Face to face برایش توضیح دهید. برای محدثه و مادرش توضیح دهید که شما به چه شکل این برنامه را برای او اجرا خواهید کرد و به چه وسایلی نیاز دارید.

اختلال در تشدید

- سناریو ۱: کودک ۸ ساله ای با شکایت اولیه هایپرزیلیتی و تشخیص شکاف زیرمخاطی و احتمال سندرم VCF مراجعه نموده است، تاریخچه گیری و ارزیابیها و ارجاعات احتمالی را انجام دهید.

سناریو ۲: کودک ۱/۵ ساله با سابقه ی شکاف کام و جراحی اولیه ی کام قبل از یکسالگی مراجعه نموده است. در حال حاضر خرانه واجی کودک حاوی واجهای /m/ و /n/ میباشد. مشاورات مرتبط با مداخله ی زود هنگام را ارائه نمایید.

سناریو ۳: نمونه ی صدای ارزیابی گفتار کیس ۵ ساله با سابقه ی شکاف کام پخش می شود. خطاهای تولیدی کودک را ثبت نمایید.

سناریو ۴: شدت هایپرنزالیته کیس را با استفاده از بافتهای گفتاری مناسب و استفاده از راهکارهای لمسی، شنیداری ارزیابی و مشخص نمایید.

سناریو ۵: خطای glottal stop خطای غالب گفتاری در مراجع ۲۰ ساله ی شماست. مراحل درمان تولید واج هدف /p/ را که دچار این خطا می باشد، اجرا نمایید.

اختلالات آواشناختی و واجشناختی

۱. کودک ۴ ساله توانایی تلفظ صحیح واج ها را تا سطح هجا دارد اما گفتار وی شامل فرایندهای واجی عمده خصوصا حذف همخوان پایانی (FCD) است. روش درمانی مناسب را برای رفع این فرایند انتخاب نموده و اجرا نمایید.

۲. کودک ۵ ساله با خطاهای تلفظی زیر مراجعه نموده است: با انتخاب بهترین رویکرد درمانی مراحل درمان را تا سطح واژه انجام دهید.

σ.....τ ω.....β Z.....d

Σ.....τ ζ.....δ η.....δ

č.....τ φ.....π.

۳. کودکی پنج ساله با خطاهای تلفظی بی ثبات و قابلیت وضوح ضعیف به کلینیک مراجعه نموده است. بهترین روش درمانی را برای ایشان انتخاب نمایید و برنامه هفته اول (دو جلسه) درمان را اجرا نمایید.

۴. آقای ۲۰ ساله با مشکل lateral lisp در صدای /s/ مراجعه نموده است. تصحیح تولید همخوان /s/ در سطح واج و هجا را با استفاده از روش sound approximation انجام دهید.

۵. سپیده صیادی ۴ ساله با اختلال در تلفظ واج های /s/, /š/, /k/, /g/, /r/ تحریک پذیری در واج های /s/, /š/ و بی ثباتی در واج /r/ به کلینیک گفتاردرمانی مراجعه نموده است. با توجه به معیارهای جدید انتخاب واج، اولین واج آموزشی را انتخاب کنید و آن را با روش modification of other sounds ایجاد نمایید.

۶. مهدی امیری ۵ ساله با اختلال آپراکسی کلامی شدید مراجعه نموده است و تعداد واژگان بیانی او بسیار محدود و تقریبا بدون کلام است. ۸ مرحله روش درمانی DTTC را برای ایشان اجرا نمایید.

۷. سارا صمیمی ۴/۵ ساله به کلینیک گفتاردرمانی مراجعه نموده است. ارزیابی اولیه اختلال در تلفظ واج های /s/,/f/,/ʃ/,/k/ را مشخص نمود. ارزیابی تحریک پذیری در یکی از واج ها را انجام دهید
۸. خانم ۲۵ ساله ای با اختلال در تلفظ واج /r/ مراجعه نموده است. با استفاده از روش modification of other sounds واج را برای ایشان ایجاد نمایید.
۹. کودک ۶ ساله با مشکل central lisp در صدای /s/ و /z/ مراجعه نموده است. تصحیح تولید همخوان /s/ را تا سطح کلمه اجرا نمایید.

اختلال در صوت

۱. مراجع با شکایت از گرفتگی صدا و خستگی صوتی مراجعه نموده است. با استفاده از نرم افزار praat ارزیابی آکوستیک را انجام و نتایج را تحلیل کنید.
۲. مراجع آقای ۴۵ سال با فیلم استربوسکوپی مراجعه کرده، در گزارش فیلم به بی حرکتی یکی از تارهای صوتی اشاره شده است. بر اساس تشخیص خود، بیمار را جهت برنامه درمانی مورد نیاز راهنمایی کنید.
۳. بر اساس GRBAS Scale نمونه صوتی ارائه شده تحلیل کنید.
۴. مراجع آقای ۵۰ سال با total laryngectomy مراجعه کرده است. مشاورات مربوط به توانبخشی صوت را برای مراجع توضیح دهید.
۵. مراجع خانم ۳۵ سال با شکایت strain/struggle حین گفتار و خستگی صوتی مراجعه نموده است. در صورت احتمال muscle tension dysphonia ارزیابی های مورد نیاز برای تشخیص صحیح را انجام دهید.
۶. مراجع آقای ۲۵ سال با سابقه خوانندگی و دیسفونی بعد از خواب مراجعه کرده است. در اولین گام درمان چه اقداماتی را انجام می دهید؟

انواع اختلالات زبان در کودکان

۱. جمله ی من سیب می خوام را با تکنیک shaping به یک کودک دچار تاخیر زبانی آموزش دهید. (توجه: کودک هر ۳ کلمه ی این جمله را می تواند بگوید ولی نه در قالب جمله)
۲. مادر کودکی ۳ ساله که حدود ۲۰ واژه ی بیانی دارد، به کلینیک مراجعه کرده. سرپرست بالینی با مادر مصاحبه کرده و کودک را late talker یا late bloomer نامیده است. اگر قرار باشد برنامه ی مراجع را برای مدت ۲ ماه به صورت مبتنی بر خانواده طراحی کنید، چگونه به خانواده مشاوره می دهید؟

۳. کودک کم شنوای ۳ ساله که از سمعک استفاده می کند، وارد اتاق درمان می شود. چگونه مطمئن می شوید که سمعکش درست کار می کند و همی فرکانس های موردنیاز برای گفتار را پوشش می دهد؟
۴. کاربرد حرف اضافه "با" را در داخل جمله به کودک کم شنوای ۳ ساله آموزش دهید (تکنیک LARSP).
۵. در این ایستگاه با والد یک کودک آسیب دیده شنوایی ۸ ماهه روبرو می شوید. مشاورات ضروری (مدل ASLD) را به والد این کودک ارائه دهید.
۶. در این ایستگاه با مادر کودک ۲/۵ ساله با تشخیص سندرم داون روبرو می شوید. کودک وی در مرحله prelinguistic قرار دارد. مشاورات لازم را به مادر ارائه دهید.
۷. در این ایستگاه با کودک ۴ ساله ای مبتلا به سندرم داون روبرو می شوید. به منظور کنترل آبریزش از دهان وی، مشاورات تغذیه ای، ماساژ و تمرینات دهانی - حرکتی لازم را انجام دهید.