



دررفتگی یا نیمه دررفتگی مفصل ران در کودکان



این عارضه در کودکان زیر شش ماه مشاهده می شود.

تشخیص: معمولاً یک پا کوتاهتر از پای دیگر است و همچنین چین های پوستی ناهموار در یک سمت ران بیشتر از سمت مقابل می باشد. البته در زمان تولد، متخصص می تواند با تست های ارتوپدی مخصوص، از وجود چنین دررفتگی آگاه شود.

درمان: برای درمان از وسیله کمکی با نام پاولیک هارنس استفاده می شود. در ابتدای درمان به توصیه پزشک به صورت ۲۴ ساعته استفاده می شود و به مرور زمان با تشخیص پزشک فقط به صورت شبانه مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه درمانگر جهت نحوه بستن وسیله کمکی: طبق شکل روبرو، این وسیله کمکی دارای چند استرپ است که بایستی درست سر جای خود بسته شوند.

استرپ های شانه ای: از روی شانه ها عبور کرده و به سگک مربوطه متصل می شود.
استرپ های سینه ای: روی قفسه سینه کودک درست به موازات نوک سینه ها بسته می شود.

استرپ های پای: در بالای مچ ها متصل می شوند.

آدرس مراکز دولتی جهت ارائه خدمات درمانی:

- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده علوم توانبخشی. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- بیمارستان الزهرا. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- مرکز جامع توانبخشی صدیقه طاهره. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- بیمارستان کاشانی. طبقه همکف. کلینیک ارتوز و پروتز