



بیماری پرتس



یک مشکل اسکلتی در کودکان است که در اثر قطع خونرسانی به سر استخوان ران ایجاد می شود. بیشترین شیوع آن در سن ۴ تا ۸ سالگی رخ می دهد. از مهمترین نشانه های این بیماری، لنگیدن است که با افزایش فعالیت، تشدید می شود. معمولاً اندام آسیب دیده دارای درد است و این درد در ناحیه جلوی لگن و کشاله ی ران حس می شود.

تشخیص: این بیماری بوسیله ی رادیوگرافی و معاینه ی فیزیکی انجام می شود.

درمان: از گذشته انواعی از وسایل کمکی برای این افراد تجویز و مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از شایعترین وسایل کمکی در شکل روبرو آمده است که بایستی در مدت زمان درمان مورد استفاده قرار بگیرد.

آدرس مراکز دولتی جهت ارائه خدمات درمانی:

- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده علوم توانبخشی. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- بیمارستان الزهرا. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- مرکز جامع توانبخشی صدیقه طاهره. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- بیمارستان کاشانی. طبقه همکف. کلینیک ارتوز و پروتز